

醫

學

心

悟

華陀外科十法總目

內消法

一

艾灸法

二

神火照法

三

刀針砭石法

四

圍藥法

五

聞口除膿法

六

收口法

七

總論用藥法

八

詳論五善七惡救援法

九

將息法

十

外科症治方藥

發背

對心發

胃俞法

手發背

足發背

方

連志膏

普救萬全膏

銀花甘草湯

陳艾圓

烏金膏

蟾酥餅

海浮散

芎芷香蘇散

皂金膏

化腐藥膏

防風湯

透膿散

參芪內托散

理中湯

化腐藥膏

衛生湯

參苓白朮散

補中益氣湯

藿香正氣散

歸脾湯

參苓白朮散

六味湯

八珍湯

歸脾湯

歸脾湯

六君湯

八味湯

八珍湯

歸脾湯

歸脾湯

腦疽

對口

偏對口

髻疽

發頤

時毒

大頭天行

方

加味世精湯
普濟清毒飲

井口疽

脇疽

肚癰

穿骨疽

魚口

管疽

方

護心散
胡桃散

九龍丹

片瘡

喉痺

纏舌喉風

乳蛾

舌蛾

懸癰

腮癰

喉癰

走馬牙疳

牙癰

牙宣

牙痛

喉痛

齒齙

肺結喉癰

方

四君子湯
三黃洲毒散
葛根湯
射香散

四物湯

加減八味湯

金鈴匙

清胃散

無牙止痛散

癰瘰

方

消癰散
如未遺遙散

鼻痔

鼻淵

方 礞砂散
古拜散

聾頭抵耳

百蟲入耳

方 紅棉散

眼丹

祟症

方 平祟散

白瘡瘡

方 麥錢散

粉刺雀斑

方 敗容丸

破傷風

方 天麻散

跌打損傷

方 澤蘭湯
韭菜散

天下第一金瘡藥

乳癰

乳岩

方 瓜蒌散
香附餅

附骨疽

伏兔疽

蛇頭毒

脫疽

臁瘡

腸癰

方 千金牡丹皮散

懸癰

藏毒

內痔外痔

脫肛

方

國老散
田螺水

土熟地黃丸

下疳

楊梅結毒

方
忍冬湯
金蟾脫甲酒

大麻風

赤白遊風

驚掌風

爛腳風

方
斬蛇酒
當歸膏

湯泡火燒

疥瘡

天泡瘡

方
麻黃湯
黃柏散

頑癬

方
百部膏

救自刎法

竹木刺入肉

方
花蕊散

瘋犬毒蟲咬

方
白芷護心散

誤服砒毒

野菌毒

救自縊

救落水

壓夢不

方

痛鼻通天散

醫學心悟卷之六

天都管明子程國彭鍾齡者

外科十法

外科十法者。予歸宗普陀時所作也。余自普陀生。長天都。五十有三載。業醫者凡三十年。爰著醫學心悟一書。詳言內症。梓行於世。而外科有未及。壬子冬。還歸普陀。修行適逢。

聖祖仁皇帝廣發帑金。修葺我

菩薩行宮。前後寺僧及工作人等。不下數千人。其中病患不一。予爲調治。悉痊。復有患背疽者。有患廣瘡。疥癬者。投以

膏散不半月而收功。因思予在天都時。僅著內科而未及外科。亦一時之闕略也。乃復聚精會神。參悟外科旨要。約以十法而施治之道。似無餘蘊。言簡而該。方約而效。以之問世。庶幾其有小補乎。將見十法一書。與醫學心悟並行於天壤間也。

內消法

內消者。腫痛初起。隨用藥消散也。凡病癰疽發背。對口疔毒。其初起憎寒壯熱。有似傷寒而痛偏一處。飲食如常者。蓄積有膿也。當初起時。膿尚未成。不過氣血乖違。逆于肉裏耳。外敷以遠志膏。或貼普救萬全膏。內服銀花甘草湯。卽時消散。若氣疔瘡。

急宜刺破。或艾灸腫處。搽上蟾蜍餅。貼以萬金膏。內服菊花甘
草湯。隨即平伏。菊花連根帶葉。皆治疔瘡之聖藥也。其中亦有
挾風寒而發者。宜先用芎芷香蘇散以散之。隨服菊花銀花等
藥。即可內消。須及早下手。不可遲滯。

艾灸法二

隔蒜灸法。勝用刀針。青云。不痛灸至痛。痛灸不痛時。凡治瘰癧
疔腫。流注。及一切無名腫毒。以大蒜切片。安瘡頂上。用陳艾炷
安蒜上。香點灸之。其艾炷大小。看瘡毒大小。爲取裁。若瘰癧之
大者。以蒜搗餅。敷上灸之。不痛者灸止痛。而止痛者灸至不痛
而止。若內已有膿。即將烏金膏塗灸處。外用普救萬金膏貼之。

爛開大口。卸却瘀膿。易收功也。若口不收。或腐肉不脫。洗用防風湯。敷以海浮散。外貼萬全膏。腐肉自去。新自生。計日可愈。真神藥也。

神火照法 三

凡腫在頭面以上者。不宜艾灸。惟引火氣上攻。宜用火照法。補手其神法。用火照散。安紙燃中。以麻油浸點。每用火三枝。離毒半寸許。照之。自外而內。俾氣透入。皮色紫滯者。立轉紅活。若瘡勢平塌者。立轉高聳。仍須不時照之。則毒氣頓解。轉陰爲陽。以收全功。且此法不止施於頭上。卽如發背等毒。亦宜用之。其頭面患毒。亦有用艾灸而愈者。固其毒純陰。平塌頑麻。非艾灸無

功。但艾炷宜小。如黍粒樣。式二法。乃瘡疽門之寶筏。宜互相參考。以神其用。

刀針破石法 四

凡毒有膿痛緊急。膿已成熟。無暇待灼艾火照者。卽宜用刀法開之。但刀法須在的。確膿熟之時。又須要深淺合度。以左手按腫處。先看膿之成否。如按下軟而不痛。腫隨手起者。膿已成也。按下硬而痛。或凹陷不起者。膿未成也。已成膿者可刺。未成膿者宜姑待之。若脾氣虛弱者。宜托補之。又須看其膿之深淺。以手皆按下軟肉深者。其膿必深。軟肉淺者。其膿亦淺。若膿淺刀深。恐傷好肉。膿深刀淺。恐膿不出而內敗。最宜斟酌。更有伏骨

之疽。膿腐於內。皮色不變者。宜以刃刺入深處。放出瘀膿。或灸
開大口。放出之。不得姑息。因循俾毒氣越爛越深也。其小刀須
利。勿令病者見。恐驚彼耳。砭法施于頭面及耳前後。因其漫
腫無頭。急用此法。以瀉其毒。取上細微鋒。用竹箸夾住。繫紮於
鋒出半分。對患處。另以箸敲之。徧刺腫處。俾紫血多出。爲善刺
畢。以精肉切片貼。再用雞子清調乳香末潤之。此地不宜成膿。
頭肉中空耳前後更多曲折。提膿拔毒。恒多未便。故砭法斷宜
早施。

圖藥法 五

書云。用膏貼頂上。敷藥四邊。開凡腫毒之夫者。將以成膿。用烏

金膏貼瘡頭上。然後用萬金膏益之。四旁用芙蓉膏敷之。貼膏處取其山膿。敷藥處取其消散。並能箍住根脚。不令展開。共作三層敷圍法。第一層用烏金膏貼瘡頭。若漫腫無頭。以濕紙貼上。先乾處是瘡頭也。第二層萬金膏貼之。第三層芙蓉膏圍之。然予嘗用萬金膏。徧覆腫處。連根脚一齊箍住。其中消處自消。潰處自潰。竟收全功。可見膏藥之妙矣。

開口除膿法 六

凡治瘡疽。口小膿多。則膿不出。或出而不盡。或薄膿可出。硬膿難出。以致瘀不去而新不生。延綿難愈。法當爛開大口。俾膿盡出。爲善。其爛藥烏金散最佳。祛瘀肉不傷新肉。且不甚痛。

爲至妙也。若有膿骨。以綿紙撚裹藥。入頻換數條。卽化去耳。亦有頑硬之極。非烏金散所能去者。則用化腐紫雲膏搽之。然終不若烏金散爲至穩。

收口法

凡瘡疽最難收口者。由瘀肉夾襍。瘀膿不盡所致。庸工不識。妄用補牆之劑。勉強收口。恐他日內毒復發。更甚于目前。惟予所用海浮散。堪稱至寶。以此敷上。瘀肉自脫。不必用力。新肉自生。又不藏毒。萬舉萬當也。大法先用防風湯洗之。再上末藥洗時。須避風爲主。昔云頻將湯洗。切忌風吹是已。更有體虛不能收口者。須內服補藥以助之。

總論服藥法 八

凡瘧疽服藥。宜照顧脾胃為主。不得已而用清涼。但期中病切。勿過劑。大法初起時。設有挾風寒者。宜先用蒼朮香蘇散一劑。以散之。散後而腫未消。隨用銀花甘草以和解之。若腫勢掀痛。大便閉結。內熱極盛者。則用衛生湯加大黃以疏利之。若病勢雖盛而元氣漸虛者。則清藥中須兼托補之劑。透膿散主之。若膿水已潰。必須托補元氣為主。參芪內托散主之。如或元氣虛寒。則補托藥中須用辛熱以佐之。脾虛者理中湯。參苓白朮散。氣虛下陷者。補中益氣湯。胃經受寒。飲食停滯者。藿香正氣散。氣血兩虛者。十全大補湯。加附子。鹿茸。茸間亦有虛而挾熱者。

即于前方中去附子姜桂加麥冬銀花丹皮等藥以收功。是又不可不知也。大抵有陽毒有陰毒有半陰半陽宜細辨之。陽毒者。瘡勢紅腫根脚不散飲食如常口渴便結五心煩熱脈洪數。陰毒者。瘡勢灰白平塌頭麻少痛根脚走散食少便溏手足厥冷口鼻氣冷脈沉遲。半陰半陽者。瘡腫雖紅不甚尖聳飲食差減大便不結寒熱往來微渴喜熱脈虛軟。此三者必須細辨。用藥寒溫得宜方為合法。治陽者清涼解毒治陰者溫中回陽。半陰半陽之治清不傷胃溫不助邪如斯而已矣。

復論五善七惡救援法

九

或問瘡疽五善七惡何謂也。答曰五善者飲食知味一也。便溺

調勻二也。膿潰腫消。膿水不臭三也。神氣清爽。動息自寧四也。
脈息有神。不違時令五也。七惡者。人渴發熱。泄瀉淋閉一也。膿
潰尤腫。膿稀臭穢二也。目睛無神。語聲不亮三也。食少不化。服
藥作嘔四也。恍惚嗜臥。氣短乏力。腰背沉重五也。唇青鼻黑。面
目浮腫六也。脈息無神。或躁動不和七也。古語云。五善得三則
吉。七惡得四則凶。余謂七惡之內。不待四矣。然而極救之法。正
不容以不講。大抵熱渴淋閉喘急內熱。皆真陰受傷。宜六味湯
加麥冬五味。如不應。用八珍湯加麥冬五味。更不應。用十全大
補湯兼服六味地黃丸。此乃補陽生陰之說也。若氣短倦怠。昏
憤乏力。飲食不化。乃陽虛之候。宜用補中益氣湯。若睡臥不寧。

宜用歸脾湯。若飲食減少而目浮腫。宜用香砂六君子湯。若兼
脾胃虛寒。更用理中湯。腎氣虛寒。須用桂附八味丸。兼用十全
大補湯加附子。此溫補回陽之法。若瘡疽潰後膿血去多。變爲
角弓反張。手足搐搦。肢體振搖而發痙者。並用參芪歸朮併附
子等藥以救乏。如不應。用十全大補湯。間有可生者。當此特勢。
性命急如懸縷。司命者宜叮嚀反覆熟思而審處之。

將息法 十

凡病中設有挾風寒者。卽宜斷去葷腥油膩。微服散藥。俟外邪
祛盡。再用滋味調補。大抵將息瘡腫。不可缺少滋味。以血肉能
生血肉也。然又不宜過多。使肉氣勝。穀氣更忌生冷滯氣之物。

恐反傷脾胃耳。並宜避風邪。戒其恣意思慮。少言語。兢兢保養。爲貴。至于病後將息。毒大者。三年內宜遠帷幙。毒小者。期年內宜遠帷幙。犯之則成虛損。或成偏枯。或陰滅。天年不可不慎也。其他戒怒慎風。亦須常作有病時想。

以上十法。乃治瘡疽發背之大綱。大者可爲小者。可知已。余生平善治外症。其心法全在于此。約而能該。確而可守也。至于周身上下所患之病名。備載於後。以資參考。

外科症治方藥

發背

對心發

腎俞發

於肩

手發

足發

生於背。名曰發背。肺經火毒也。生于背下。與心相對。名曰對心。
發心經火毒也。生于腰。名曰腎俞。發腎經相火之毒。若生于肩。
脊。名曰搭背。右為肺火。左為肝火也。生于手背。名曰手發背。是
背名曰足發背。脾經濕熱之毒也。有如連子形者。頭多突起。有如
蜂巢形者。孔多內陷。外結螺磨。此二種須防毒陷。大率此症皆
由膏粱厚味。或六淫外客。七情內鬱所致。積聚不散。以致榮氣
不從逆於肉裏耳。初覺腫痛。即宜用藥消散之。散而不去。則用
艾灸提膿等法。癰疽之症。始為熱中。末為寒中。不可不察也。
遺志膏 凡一切癰疽腫毒。初起之時。隨用遺志肉二三兩。去
心。清酒煮爛。搗如泥。敷患處。用油紙隔布扎定。越一宿。其毒

立消屢試屢驗其效如神

普救萬全膏 見卷三痺症

銀花甘草湯 治腫毒初起時皆可立消內服此藥外服達志膏一切惡毒無不消散但宜早服為妙倘瘡已成膿必須外潰無從消散也

金銀花 兩

甘草 二錢

水煎清酒沖服。○若毒在可焦加牛膝二錢

陳艾圓 一海歲端午日皆斬艾一二斤愈久愈良用時取葉為炷或加射香木香明雄黃末搓成團安蒜上灸之名藥艾圓蟾蜍餅 治疔毒癰疽乳癰附骨疽臂癰一切惡症或不痛或

大痛或麻木用此敷貼瘡頭

蟾除酒化

輕粉五分

乳香

沒藥

雄黃

芭莖各二錢

射香三分

硃砂一錢

朝脂一錢

錢

以上各為細末，手五月五日午時在淨室中用蟾蜍酒和藥，丸如菰荳大，每用一九口涎調塗貼疔瘡上，以膏蓋之。

菊花甘草湯 治疔之仙藥也。

白菊花 四兩

甘草 四錢

水煎頓服，渣隨卽再煎服，重者不過三劑卽消，至穩至效，切勿消疥之劑，皆不及此。

月止香蘇散 凡毒多有挾風寒而發者，宜先用此散之，如毒

不消隨服銀花甘草等藥

川芎

白芷

紫蘇葉

赤芍

陳皮

甘草各一錢

荆芥

香附

秦艽各一錢五分

連翹葱白二寸水煎服。若兼傷食加山楂麥芽葡子。若

內熱極盛加連翹麥子。

烏金膏 去腐肉不傷新肉最為平善。

巴豆去殼新瓦上炒黑研細聽用多寡看瘡勢酌量。

防風湯

防風

白芷

甘草

赤芍

川芎

歸尾

各二錢

雄豬膽

一節

加連須葱白五根用三大碗水煎以絹片蘸水洗之拭乾然後上藥其深曲處以羊毛筆洗之

海浮散 敷此腐肉自化新肉自生此外科回生保命之靈丹也予治外症全倚之

乳香

沒藥 等分

右二味安箬皮上火炙乾為極細末敷患處每貼膏藥此散毒淨則收口毒不淨則提膿外出其神妙難以言喻

火照散

硃砂

血竭

沒藥

明雄黃各三

射香 五分

石五味爲細末、用綿紙條長尺許、每條震藥三分、真酥油浸點自外面、內周圍照之、瘡毒隨藥氣解散、白不內侵、臟腑初用三條、漸加至五七條、瘡勢漸平、又漸減之、薰籠、隨上烏金膏貼以萬全膏、若腫勢漫衍、周圍用芙蓉膏敷之、如再薰須洗去末藥、其貼膏藥處藥油可不必洗。

芙蓉膏

用赤小豆四兩、芙蓉葉四兩、香附四兩、菊花葉四兩、白芨四兩、爲細末、每末一兩、加射香一分、米醋調塗在根脚、雞子清調亦可。

化腐紫霜膏

治癰疽發背、瘰癧肉不腐、及不作膿者又惡瘡。

內有膿而外肉未穿潰者

輕粉

蓖麻仁

研各三錢

巴豆

研白仁五錢

血結

二錢

樟腦

蜈蚣肉

各一錢

金頂砒

散五分

共為末磁罐收貯臨用時麻油調搽頑硬肉上以萬全膏貼之至頑者不過二次即軟其方大於烏金散

衛生湯

解毒消癰清熱活血止痛初起相宜

白芷

連翹

花粉

各八分

荆芥

甘草節

薄荷

各一錢

防風

乳香

沒藥

各五分

銀花

三錢

貝母

歸尾

各一錢九分

水煎服○若大便秘結熱勢極盛者加酒炒大黃二三錢

透膿散 凡癰毒內已成膿不穿破者服此即破

黃芪 錢四

皂刺

白芷

川芎

牛蒡子

穿山甲 一錢

炒研名

金銀花

當歸 各五

酒水各半煎服

參芪內托散 丹溪云癰疽未潰以疎托解毒為主。癰疽既潰

以托補元氣為主。二語可為外科樞要。

人參

一錢 虛甚者倍用

黃芪 三錢 酒炒

當歸 二錢

川芎 酒炒 五分

炙草

一錢 五分

陳皮 五分

金銀花 五錢

丹皮 一錢

遠志

去心甘草水炮 炒二錢 五分

大棗五枚水煎服

理中湯 溫補中氣 挽回元陽

人參 二錢
黑姜 一錢五分
甘草 炙 二錢
白朮 三錢 陳

附子 姜汁甘草水製一錢

大棗五枚 去核水煎服

參苓白朮散 健脾胃

人參 一兩
茯苓 二兩
山藥 炒
苡仁 炒

扁豆 炒
蓮肉 去心炒 各三錢
砂仁 一兩
神曲 炒黑

甘草 五錢 炒各
白朮 四兩 陳
陳皮 一兩 微炒

共為細末 每用三錢 開水下

補中益氣湯 中氣下陷者舉之 顛頂有病需此

人參

炙甘草

當歸各一錢

升胡

柴胡各三分

陳皮五分

黃芪二錢

白朮二錢五分

大棗二枚、生薑一片、水煎服、

藿香正氣散 散風寒、消飲食、止嘔吐、瀉利、

藿香

砂仁

厚朴

茯苓

紫蘇葉

陳皮各一錢

白朮陳土炒

半夏

桔梗

白芷各七分

甘草炙五分

生薑三片、水煎服

十全大補湯 岐補氣血、乃扶危定傾之大藥、為收功保命之

神丹。

人參

白朮陳土炒各三錢

黃芪蜜炙五錢

茯苓一錢

當歸

一錢五分

大熟地

二錢九晒

白芍

酒炒一錢五分

甘草

炙八分

川芎

肉桂去皮各五分

大棗五枚、姜三片水煎服。○虛甚者，更加附子、鹿茸。

六味湯 壯水之主以鎮陽光。凡腎經真水不足，虛火上炎，脈數有熱者宜此。

大熟地

四錢

山萸

山藥各二錢

丹皮

茯苓

各一錢五分

澤瀉

一錢

水煎服

八珍湯

即六補湯去黃芪、肉桂。

歸脾湯 治思慮傷脾、榮血不足、睡臥不寧。

人參

白朮

當歸

棗仁

炒

白芍

各一錢

黃芪

一錢五分

遠志

去心

甘草

甘草

炒各七分

木香

五分

元眼肉五枚、水煎服。

香砂六君子湯 理脾化痰、溫胃進食。

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

半夏

各一錢

砂仁

藿香

各八分

姜二片、棗三枚、水煎服。

桂附八味湯

益火之原、以消陰翳。

凡腎經真陽不足、火衰不

能生土、脈虛大無力者、宜此。

大熟地八兩

山萸肉

山藥各四兩

丹皮

茯苓

澤瀉各三兩

附子

肉桂各兩

用煉蜜丸每服四錢淡鹽水下

紫金錠

見第卷咽疾症

腦疽對口 偏對口

生於腦名曰腦疽。生于頸後名曰對口。生于頸旁名曰偏對口。正對口易治。偏對口難治。因其軟肉與喉相近也。多因營梁醇酒風寒壅遏所致。宜用神火照法。次用烏金膏搽之。外貼萬全膏。取其易潰。潰後則用防風湯洗之。搽以海浮散。仍貼萬全膏。頻換數次。即愈矣。

餐疽

發頤

時毒

大頭天行

生于耳前後名曰餐疽。生于兩頤名曰發頤。初起宜用銀花甘草湯加柴胡荆芥薄荷蘇子以清散之。若腫勢甚極須用砭法。若已成膿而未潰者以烏金膏擦瘡頭。蓋以萬全膏自然腐潰。潰後則用海浮散並貼萬全膏。自應尋愈。頤下漫腫無頭名曰時毒。俗名蝦蟆瘟是也。頭面盡腫名曰大頭天行。俗名大頭瘟是也。此皆風火鬱熱所致。初起宜用加味甘桔湯以消散之。散而不去則用普濟消毒飲以清之。若腫勢極盛兼用砭法。普濟消毒飲

甘草

桔梗

黃芩

酒炒

黃連

酒炒各
一錢

玄參

橘紅

柴胡各五

薄荷六分

升麻二分

連翹

牛蒡子炒各一錢五分

水煎服。便閉甚加大黃酒炒一錢。體虛加人參五分。

井口疽

脇癰

肚癰

穿骨疽

魚口

腎癰

生于心名曰井口疽。生于脇名曰脇癰。生于腹名曰肚癰。生于手足腕名曰穿骨疽。生于腿名曰魚口。生于腎名曰腎癰。施治並如前法。

護心散 患井口疽者宜多用他症亦宜用此

遠志肉

一兩五錢去心甘草水炮炒

紫葳

粉二兩

甘草五錢炒

明乳香

一兩等上炙

辰砂

二錢新細水飛

共為細末每服三錢開水下

九龍丹 治魚口便毒騎馬瘡橫痃初起未成膿者宜此

兒茶

血竭

乳香

沒藥

青木香

穿山甲炒各一兩

右各等分為末歸尾三兩紅花二兩酒煎膏丸如桐子大每服二錢空心熱酒送下數服自消

胡桃散

以大胡桃剖開口將全蠟二枚納入燒灰存性研末熱酒沖服

疔瘡

疔瘡初起如疥。形如粉刺或小泡。堅硬如疔。故名曰疔。大抵肉色紅腫。根脚不散者吉。若平塌漫腫。四圍灰白者凶。其狀不一。其色不同。有紅紫黃白黑之五種。以應五臟。若生兩足多有紅絲至臍。生兩手多有紅絲至心。生面唇多有紅絲入喉。俱難治。速宜針紅絲出血。多有生者。若患于肢末之處。毒愈凝滯。藥難導達。艾灸之功。爲大。內服菊花甘草湯。至效。如妄用疎利之劑。耗損真氣。不惟無以去毒。而害反隨之矣。其治法卽見前十法中。

喉痺

喉間腫痛。名曰喉痺。古人通用甘桔湯主之。然有虛火實火之

分果喉漫喉之別。不可不審。虛火者。色淡微腫。溺清便利。脈虛。飲食減少。此因神思過度。脾氣不能中護。虛火易至上炎。乃內傷之火。名曰慢喉。風虛症也。午前痛甚者。屬陽虛。四君子湯加桔梗。麥冬。五味。當歸。午後痛甚者。屬陰虛。四物湯加桔梗。元參。如不效。必加桂附。以爲引導之用。加減八味湯。加牛膝。主之。若脈數有熱。六味湯主之。更有中寒咽痛。治用半夏。桂甘湯。不可悞投涼藥。實火者。醇酒膏粱。風火積熱。火動生痰。腫痛暴發。甚則風痰壅塞。湯水不入。聲音不出。此外至之火。名曰緊喉。風實症也。宜用燈篙油。和漿水灌之。導去痰涎。或用土牛膝湯。和酸醋灌之。或針刺紅腫之處。發泄毒血。或用金鎖匙。吹之。俾

喉漸鬆開。飲食可入。聲音得出。乃止。宜服加味甘桔湯。熱甚者。兼用三黃解毒湯。諺云。走馬看喉。痺是也。凡喉腫不刺血。喉風不吐痰。喉瘡不放膿。乳蛾不針破。此皆非法。又有勞嗽日久。咽傷聲損者。無法可療。

纏喉風

纏喉風症。咽喉腫痛。脹塞。紅絲纏繞。故名纏喉風。甚則腫達於外。頸如蛇。纏。探吐。悉如前法。

纏舌喉風

纏舌喉風。硬舌根而爛兩旁。以羊毛筆蘸甘草水洗之。吹以柳花散。

乳蛾

乳蛾生喉間。狀如乳頭。一邊生者。名單乳蛾。兩邊生者。名雙乳蛾。以小刀點乳頭。出血立瘥。吹以柳花散。再服甘桔湯。凡針乳蛾。宜針頭尾。不可針中間。鮮血者。易治。血黑而少者。難治。凡用刀針血不止者。用廣三七爲細末。吹刀口上。卽止。凡使刀針。不可傷蒂。丁及舌下根。切記。

舌衄

舌衄出血不止。用六味湯。加生地。麥冬。牛膝。玄參。主之。並吹柳花散。

懸癰

懸癰生于上腭。形如紫李。宜針破癰頭。用甘草湯攪盡瘀血。吹服悉如前法。

腮癰

腮癰生腮下。繞喉壅腫。先用薤汁調玄明粉。攪去其痰。再看其紫黑處。針去瘀血。其吹服如前法。

喉瘡

喉瘡。命門相火也。瘡勢灌膿。以銀針挑破之。隨用荆芥甘草煎湯洗之。其吹服如前法。

走馬牙疳

牙癰

牙宣

痛

走馬牙疳。牙齦紅腫。漸變紫黑。臭穢。胃熱也。牙癰。牙邊腫痛。灌

喉也。牙宣。牙。根。腫。宣。露。於。外。也。吹。以。柳。花。散。兼。服。清。胃。散。牙。痛。療。牙。止。痛。散。兼。服。葛。根。湯。

喉癰

喉癰生於喉旁。形如圓眼。血絲相裹。不可用刀針。宜吹射香散。並服加味甘桔湯。

齒唇

齒唇上起泡如齒。初起即用小小艾炷灸之。貼以萬全膏。

肺絕喉痺

肺絕喉痺。凡喉痺日久。頻服清降之藥。以致癰湧聲瘖。或痰聲如曳鋸。此肺氣將絕之候也。法在難治。宜用獨參湯。或兼進入

味湯或兼用十全大補湯早服者可救十中之二二
四君子湯

人參

白朮

茯苓

甘草

各錢

大棗二枚生薑二片水煎服

四物湯

川芎

五分

大熟地

當歸

白芍

各錢

水煎服。加丹皮麥冬玉竹山藥茯苓退虛熱至效
加減八味湯

大熟地

四錢

山萸

去核

山藥

各二錢

丹皮

茯苓

澤瀉

各五分

錢

肉桂

五味

各五分

水煎服

。本方去五味加附子名八味腎氣湯

金鑰匙

治喉閉纏喉風痰涎壅塞口噤不開湯水難下

焰硝

一兩五錢

礪砂

五錢

片腦

二分五厘

雄黃

二錢

白姜

全一錢

各另研為末和勻以竹筒吹患處痰涎即出如痰雖出腫痛仍不消急針患處去惡血服蘇藥

三黃解毒湯

黃連

二錢

黃芩

黃蘗

黑山梔

各一錢五分

水煎服

柳花散

治喉癰並口舌生瘡走馬牙疳咽喉腫痛諸症

真青黛

蒲黃

黃柏

人中白

冰片

五分

硼砂

五錢

共為細末吹喉極效

清胃散

升麻

一錢

生地

二錢

黃連

連翹

丹皮

各一錢

水煎服

療牙止痛散

止牙痛神效

牙硝

三錢

硼砂

三錢

雄黃

二錢

冰片

一分五厘

射香

五厘

共為末，每用少許擦牙。

葛根湯

葛根 一錢 升麻 一錢 甘草 五分 赤芍 一錢 五分

水煎服。風勝加荆芥防風薄荷，火盛加連翹丹皮生地黃子。

射香散

真射香 二錢 冰片 三分 黃連 一錢

共為末，一日夜吹五六次。

療癰

癰癰，癰上吸癰癰也。此肝火鬱結而成，宜用消癰丸，兼服加

味道透散

消癰丸

此方奇效治愈者不可勝計予曾刻方普送矣

玄參

熟

牡蠣

碎 蝦 醋

貝母

去心 蒸 各四兩

共為末

煉蜜為丸每服三錢開水吞下日二服

加味道散

治肝經鬱火頸生癰癰並胸脇脹痛或作寒熱

甚至肝

木生風眩暈振搖或咬牙發癰諸症經云木鬱達之

是日

柴胡

枳殼

當歸

白朮

甘草

白芍

丹皮

黑山枝 各一

薄荷

五分

水煎服

鼻痔
鼻淵

鼻痔。鼻生息肉也。起於濕熱。可吹硃砂散鼻淵。鼻流濁涕不止也。起于風熱。可用古拜散。

硃砂散

硃砂 五分

白礬 煨枯 二錢

共爲細末。每用少許點鼻痔上。卽消。

古拜散

荊芥 惠

右爲細末。每服三錢。生姜湯調下。有火者。陳茶調下。

聾耳 百出入耳

聾豆抵耳耳內生疔也。乃肝經鬱火所結。可用紅綿散兼服。加味道遙散。加菊花百蟲入耳。以猫尿滴入。奇效。

紅綿散

白礬 二錢 麝香 一錢 燒灰存性

右研勻。先用棉杖子攪去膿水。更用棉杖子攪藥。參入于耳底。即乾。若聾豆抵耳。加射香五厘。

眼丹 眼珠忽突

眼丹。眼旁生泡潰而流水也。屬風熱。加味道遙散主之。又眼珠忽然腫脹。突出。屬祟症。平祟散主之。

平祟散

黃連 二分

甘草

冰片 各一分

硼砂 三分

人乳調點兩眼角立消

白禿瘡 髮落不生

白禿瘡此火旺血熱而生蟲也。麥錢散主之。髮落不生骨碎補爲末麻油調搽之。

麥錢散

用小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內爲末和硫黃末四兩白砒末五錢攪勻待冷取起加烟膠半斤川椒末二兩生枯礬各二兩共碾極細臨用葱湯洗淨末藥二三錢麻油調搽油

紙蓋孔三日一換三次愈

粉刺雀斑

粉刺雀斑風熱也改容丸主之

改容丸

大貝母

心

白附子

防風

白芷

菊花葉

滑石

各五錢

右為細末用大肥皂十錠蒸熟去筋膜搗和藥為丸早晚洗面

破傷風

破傷風因跌打傷頭腦而客邪乘之以致手足搐搦人事昏憤

天麻散主之。

天麻

生南星

泡去
防風各一

荆芥

三兩

右爲細末，每用五錢，連須葱白煎湯調下。

跌打損傷

跌打損傷之後，凡大小便通利者，可用廣三七二三錢，酒煎飲之。或服澤蘭湯。若二便不通，必加大黃。其破損處，可用血結爲極細末，摻之。韭菜散亦良。余用天下第一金瘡藥最佳，可保無虞。

澤蘭湯 通二便，除腸中瘀血，乃活命之靈丹也。

澤蘭

當歸

各五錢

紅花

一錢

丹皮

三錢

清木香

一錢五分

桃仁

去皮尖
研十粒

赤芍

一錢五分

水煎熟酒冲服

如大便不通

加大黃二三錢

酒炒

荏葉散

止血如神

石灰同荏葉搗餅貼壁候乾細研篩下聽用

天下第一金瘡藥。凡刀斧損傷跌仆打碎敷上即時止痛止

血更不作膿勝于他藥多矣其餘處不可見水余製此藥普

送洄路遠者一時難取故刻方席傳之今並筆之書則其所

傳益廣矣各鄉有力之家宜修合以濟急也

雄猪油

一斤

松香

六兩

面粉

四兩

射香

六分

黃蠟

六兩

樟腦

三兩

研水片

六分

血結

一兩

兒茶

可

乳香

一兩 箬皮

沒藥

一兩 同製

以上藥研極細。先將油松香黃蠟三味熬化。濾去渣。待將冷。再入藥末。攪勻。磁器收貯。不可洩氣。

乳癰

乳岩

乳癰者。乳房腫作膿。膿盡則愈。其初起。宜服瓜蒌散。敷以香附餅。即時消散。若已成膿。則用太乙膏貼之。若潰爛。則用海浮散。摻之外。貼膏藥。吸盡膿。自愈。乳岩者。初起內結小核。如棋子。積久漸大。崩潰有巉巖之勢。故名乳岩。宜服逍遙散。歸脾湯等藥。雖不能愈。亦可延生。若妄行攻伐。是速其危也。

瓜蒌散

瓜蒌 一個

明乳香 二錢

酒煎服

香附餅 敷乳巖 即時消散 一切瘰癧 腫皆可敷

香附 細末 一兩 射香 二分

右二味 研勻 以蒲公英二兩 煎酒去渣 以酒調 熱敷患處

太乙膏 治一切瘰癧 腫毒 用之提膿 極效

肉桂 二錢 五分 白芷 當歸 玄參

赤芍 生地 大黃 土水龍 各五錢

乳香 末二錢 沒藥 末二錢 阿魏 一錢 輕粉 一錢 五分

血餘 一團 黃丹 六兩 五錢

以上各藥 用真麻油一斤 浸入 春五夏三 秋七冬十 日傾入

鍋內文武火熬至藥枯浮起爲度。住火片時用布袋濾淨藥
渣。將鍋展淨入油。下血餘再熬。以柳枝挑看。俟血餘熬枯浮
起。方箒熬熟。每淨油一斤。將炒過黃丹六兩五錢徐徐投入。
不住手攪。候鍋內先發青烟。後至白烟。蓋蓋旋起。其膏已成。
將膏滴入水中。試軟得中。端下鍋來。方下阿魏散膏面上。俟
化盡。次下乳香沒藥輕粉攪勻。傾入水內。以柳水攪成一塊。

附骨疽

伏兔疽

附骨疽。內裏漫腫而皮色不變也。宜用艾圓灸之。俾其轉陰爲
陽。乃吉。若生于膝上三寸。名曰伏兔疽。法在不治。

蛇頭毒

蛇頭毒。手足指腫大如蛇頭也。宜用艾炷隔蒜灸之。以雄黃白芷等末爲末。全大蒜搗爛敷之。或嚼生栗敷之亦效。

脫疽

脫疽生于手足指。宜用艾灸之。若腫腐潰爛。搽以海浮散。貼以萬全膏。

臙瘡

臙瘡生于足之內外廉。宜服生熟地黃圓。並敷海浮散。貼以萬全膏。若濕熱甚而潰爛不收口者。于海浮散內加入葷椒散。貼敷立效。

腸疳

腸癰有生于腸內者。腹內脹急。大小便牽痛如淋。轉側搖之作水聲。潰後則膿從大便出。有生于腸外者。當臍腫痛。腹皮脹急。潰後則膿自臍出。甚則穿潰。大腸食蟲亦自臍出。勢難爲矣。初起宜用千金牡丹皮散以消之。既潰則用參芪內托之劑。

千金牡丹皮散

丹皮

五錢

苡仁

一兩

薏仁

去油三錢

桃仁

去皮尖研二十枚

水煎服

懸癰

臍毒

內痔外痔

脫肛

懸癰生于腎囊之後。肛門之前。又名海底漏。最難收功。臍毒生于肛門之兩旁。初時腫痛。繼則潰膿。總由濕熱相火。內灼庚金。

而然也。宜服國老散。加減地黃丸。並敷海浮散。貼膏藥。此一定之治法也。內痔外痔。亦並可服前藥。沈以忍冬藤。菖蒲草。兼用田螺水。搽之。可以立消。脫肛。屬氣虛。補中益氣湯。亦有血虛火旺者。四物湯加升。

國老散

甘草七段。用急流水一碗浸之。炙乾。又浸又炙。以水盡爲度。研細末。每日空心。開水調下二錢。忌煎炒烟酒炙烤辛辣發氣等物。

生熟地黃丸

大熟地

九蒸

大生地

酒洗各三兩

山

藥

乳拌

茯苓

乳

丹皮

酒蒸各一兩半

澤瀉

鹽水蒸二兩

當歸

酒蒸

白芍

酒炒

栝子

去壳屑紙炒

丹參

酒蒸各二兩

遠志

去心甘草水炮蒸四兩

自敗龜板

浸去脂並便炙酥研為極細末四兩

共為末，用金釵石斛四兩，金銀花十二兩熬膏，和煉蜜杵為丸，每早淡鹽湯下四錢。

田螺水

法用大田螺一箇，以冰片，糝磨中，仰放蓋內，少頃水流出，取擦痔瘡上，其腫立消。

下疳

下疳生瘡，濕癢，或陰莖腫爛，或如菌如蛇，此濕熱之甚也，宜服

九味蘆薈丸並用加味道遙散氣虛者佐以加味歸脾湯

九味蘆薈丸

蘆薈 五錢

胡黃連

當歸

芍藥

川芎

燕蕩 各一兩

木香

甘草 各三錢

胆草

七錢酒浸炒焦

右為末米粥糊丸麻子仁大每服一錢或一錢五分開水下

楊梅結毒

楊梅結毒不可擦輕粉恐毒氣歸內宜服忍冬湯貼以萬全膏

並用金蟬脫甲酒

忍冬湯

金銀花兩一

甘草二錢

黑料豆二兩

土茯苓四兩

水煎每日一劑、須盡飲、

金蟬脫甲酒

治楊梅瘡不拘新久輕重皆效、好酒五斤、用大蝦蟇一箇、浸酒、封口、煮香二枝、取起、待次日、隨量之大小、總以醉爲度、冬夏蓋暖出汗爲效、存酒、次日只服量之一半、酒盡瘡愈、又治楊梅結毒、筋骨疼痛、諸藥不效者、更妙、服酒後七日不許見風、爲要、忌口及房事、百日絕根矣、

火癰風

赤白遊風

鵝掌風

爛脚風

火癰風、皮膚腫烈、搔痒、頑麻、如樹皮吐汁之狀、此濕毒生蟲、甚

則眉毛剝落鼻柱崩壞事不可為也。宜服折蛇酒。搽以當歸膏。
○赤白遊風肌膚搔痒起皮也。鵝掌風手足心頑厚起皮也。爛
脚風脚下濕爛也。並可搽當歸膏。內服逍遙散。兼用生熟地黃
圓。

折蛇酒 烏梢蛇亦可用

折蛇 去頭尾 一具 生地 一兩

黃柏

苦參

丹參

菊花

銀花

丹皮

赤芍

當歸

枸杞子

蔓荊子

赤茯苓

草薢

百部

秦龜

獨活

靈仙 各五錢

桑枝

一兩 五錢

右煮好生酒五十斤退火七日飲

當歸膏 治癘風並可搽赤遊丹鵝掌諸風

當歸

生地

各一兩

紫草

麻黃

木鼈子

去殼

大風子

去殼

防風

黃柏

玄參

各五錢

麻油

八兩

黃蠟

二兩

先將前九味入油熬枯濾去渣再將油復入鍋內熬至滴水成珠再下黃蠟試水中不散為度候稍冷傾入盞碗內坐水中出火毒三日聽用

湯泡火燒

湯泡火燒不宜見冷水宜用白芝麻殼燒灰存性研細末敷之

若患處乾燥。則用麻油調搽。或用桐子樹皮為末。麻油調敷亦善。

疥瘡 天泡瘡

疥瘡有細小不足膿者。多屬風熱。有肥大灌膿者。多屬濕熱。俱用麻黃膏搽之。十日可愈。而不隱瘡。仍多服金銀花為妙。更有天泡瘡。腫起白泡。小者如菜荳大。大者如蚕荳大。連片而生。或生頭頂。或生耳前後。宜用黃柏散敷之。立瘥。

麻黃膏

雄猪油 四兩 斑貓 三箇 麻黃 五錢

蓖麻子 一百粒去壳研爛 大風子 一百粒去壳研爛

先將猪油化開下斑蝥煎數沸隨去斑蝥再下麻黃煎枯濾去渣將火麻苧麻肉和勻聽搽

黃柏散黃柏一大塊以猪胰塗蝮炙爲末麻油調搽

頑癬

頑癬乃濕熱凝聚蟲行皮中有頑厚堅硬者俗稱牛皮癬是宜用百部膏搽之

百部膏

百部

白鮮皮

苧麻子去壳

鶴虱

黃柏

當歸

生地各一兩

黃蠟二兩

明雄黃末

五錢麻油八兩

先將百部等七味入油熬枯。濾去渣。復將油熬至滴水成珠。再下黃蠟。試水中。凝散爲度。端起鍋來。將雄黃末和入。候稍令傾入磁盆中收貯。退火聽用。

自勿

救自勿法。凡自勿喉管未斷者。不可見水。急用麻線縫之外。以血結細末。揜之。隨用天玉膏。或金瘡藥厚塗之。綿紙蓋定。然後用狹布裹脚纏住。線扎之。間日加敷藥。頭不可動搖。十日愈。

竹木刺入肉

竹木刺入肉。拔不出者。用象牙藥水滴之。良久自出。或用螻蛄。或爛敷之。亦出。若日久血凝腫脹者。以花蕊散用象牙水調。

瘀血散而刺並出矣。

花蕊散 花蕊石爲末八

兩、硫黃末四兩和勻、瓦礫盛之、封口

鹽泥固濟、晒乾、安風爐

中、上下著火、煉二炷香、候冷、打開、研

篩爲極細末、收貯、此散

瘀血之神藥也。

風犬咬

毒蛇蜈蚣咬

風犬咬。用明雄黃末五錢。

杏仁去皮尖一百粒炒研。每服二錢。

虎骨煎酒送下。服盡必愈。

外並用此敷患處。毒蛇蜈蚣咬。用明

雄黃細末。用蒜搗爛敷之。

內服白芷護心散。

白芷護心散

白芷 一兩

乳香 三錢

雄黃 五錢

甘草 五錢

共爲細末每服四錢清酒調下

誤服砒毒野菌毒

誤服砒毒小蘗根搗汁灌之或用金汁灌之或用明礬大黃爲末新汲水調灌之得吐利爲效野菌毒亦用金汁解之紫金丹亦佳

自縊

救自縊抱下除解繩索用好肉桂三錢煎湯灌之

落水

救落水以其人橫伏水牛背上漚去腹中之水如無牛以撓代之隨用通天搐鼻散吹鼻中得嚏則活獨用半夏末吹之亦

佳

魔夢不醒

魔夢不醒吹以通天散更用葱白生姜煎酒灌之
搐鼻通天散

猪牙皂角

去皮玄一兩

細辛

去葉

半夏

各五錢

共為極細末每用一二分吹鼻中得嚏則蘇

補遺

加味甘桔湯

在鬚直門

甘草

桔梗

各三錢

夢子

炒二錢

荆芥

三錢

薄荷

五分

貝母

五錢

水煎服。若兩頤腫盛者，加柴胡一錢五分，丹皮三錢。

至哉醫之爲道也天地賴以立心民生賴以立命自非由博覽而得其精詳由精詳而得其會通鮮不以活人之術而反爲天下毒吾師

鍾齡程先生博極羣書自靈素難經而下於先賢四大家之旨無不融會貫通以故病者雖極危篤而有一綫之可生先生猶能起之是豈不與

上天之好生如來之普濟心心相印也哉歲己酉余負笈從先生遊自愧固陋無以窺先生之奧而朝而誦讀晝而見症

夜而辨論如是者有年殆稍稍有得焉 先生學彌精心彌
下年來脩極攻苦常徹夜不寐天未曙輒剪燭搦管舉平日
所心得者一一筆之於書間有未縝細者必繩削之至於盡
善而後已其中條分縷析因症定方不肯稍留餘憾以誤後
來學者大抵方藥一衷諸古而又能神而明之以補昔人智
力之所不逮蓋昔人之論分分則偏 先生之論合合則全
昔人有引而不發之旨得 先生之剖抉而燦如日星昔人
有反覆不盡之論得 先生之辯晰而悉歸易簡其書似平

淡無奇而千變萬化總不出其範圍至其命是編也曰醫學
心悟誠以學非精詳不可以云學學必會通乃可以言悟悟
不先之以學則無師而所悟亦非學不要之以悟則固執面
所學亦淺而其原總操之一心學者心學之也悟者心悟之
也心學之而心悟之夫而後其心卽

上天好生之心 如來普濟之心也書旣竣將付諸剞劂余自愧
固陋終無以盡

先生之與惟是抄錄成編校考點畫俾觀是書者歎 先生之

學能精詳又能會通而天地民生之成有賴也雖然先生

之爲是編也不求炫世祇期信心既堪信心爰以授徒余幸

得爲先生徒敢不以先生之心爲心而博極羣書益知

先生之學爲有本漸以融會貫通得希先生之悟於萬一也

哉休寧石嶺受業門人吳體仁百拜謹識